

Medicamentos Opiáceos para el Dolor


Los medicamentos opiáceos son usados para el tratamiento del dolor moderado a severo. Los opiáceos pueden proporcionar alivio cuando otros medicamentos no funcionan.



Su meta debe ser alcanzar un nivel de alivio del dolor que le permita seguir haciendo las cosas que le gustan y necesita hacer.



Tome mas agua, coma más fibra, y si su doctor lo receta tome laxantes para evitar la constipación.



Llame a su doctor si los medicamentos no están funcionando.

- Si tiene dolor, siempre dígaselo a su doctor.
- Junto a su doctor haga un plan para usar sus medicamentos para el dolor.
- Su meta debe ser alcanzar un nivel de alivio del dolor que le permita seguir haciendo las cosas que le gustan y necesita hacer.
- Puede tomar algunos días acostumbrarse al uso de los medicamentos opiáceos
- Cuando los medicamentos para el dolor son usados adecuadamente, no debieran dejar de funcionar o llegar a ser adictivos.

Pregunte a su doctor cuando, como, que cantidad y con que frecuencia usted se tiene que tomar sus medicamentos.

Pregunte a su doctor sobre el uso de laxantes que usted podría necesitar mientras esta tomando los medicamentos opiáceos.

Pregunte a su doctor sobre las formas mas seguras para reducir y discontinuar el uso de opiáceos.

Llame a su doctor si los medicamentos no están funcionando –o si le caen mal al estomago, tiene vómitos o se siente con mucho sueño.

Para ayudarle a tomar sus medicamentos opiáceos en forma correcta:

- No tome medicamentos opiáceos para el dolor a menos que su doctor lo recete.
- Siempre que tome medicamentos para el dolor hágalo como su doctor lo recete.
- Nunca tome medicamentos para el dolor que hayan sido recetados a otra persona y nunca deje que otros tomen sus medicamentos.
- Llame a su doctor si sus medicamentos para el dolor no funcionan o si los medicamentos le caen mal.
- Llame a su doctor antes de cambiar el como y cuando tomarse sus medicamentos.
- Tome mas agua, coma más fibra, y si su doctor lo receta tome laxantes para evitar la constipación.
- No beba alcohol o tome otros medicamentos que contengan alcohol.
- No tome medicamentos para el dolor si va a conducir o si necesita estar alerta.
- Mantenga sus medicamentos en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.

Producido gracias al apoyo de **Endo Pharmaceuticals**

Para más información, vea www.MedlinePlus.gov y busque por “Medicamentos Opiáceos para el Dolor.”

©2007 ACP Foundation